

## Flora autóctona: Camboatá blanco



**Ing. Agr. Carlos Brussa**

**Ing. Agr. Iván Grela**

**Sapindaceae** (familia del "Chal-Chal")

**Matayba elaeagnoides** Radlk. "Camboatá blanco"

### **DISTRIBUCIÓN REGIONAL:**

Noreste de Argentina, mitad sur de Brasil, Paraguay y Uruguay.

### **CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:**

Hábito: árboles de porte mediano, hasta 10-15 m de altura, fuste recto con la corteza relativamente lisa y blanquecina.

Follaje persistente, verde lúcido, cuando crece expuesto al sol en las cornisas de los cerros chatos

se torna verde claro muy brillante.

Hojas alternas, compuestas, amplias (de hasta 20 cm de largo), paripinnadas, con los folíolos alternos o subopuestos, coriáceos, brillantes, elípticos u oblanceolados, de ápice redondeado y obtuso, a veces con un corto acumen, margen entero y base aguda, subsésiles, hojas pecioladas con el raquis verdeamarillento. Inflorescencia en panojas axilares agrupadas hacia el extremo de las ramillas, más cortas que las hojas, poco llamativas.

Flores hermafroditas, pequeñas, verde amarillentas. Frutos cápsulas tricocas esféricas, lisas, de color rojo anaranjado muy llamativas, con tres semillas de color negro brillante.

No se utiliza como ornamental a pesar de su potencialidad.



**FENOLOGÍA:**


Florece en primavera aunque no es llamativo, fructifica a comienzos del verano.

**REPRODUCCIÓN:**

En almácigos a partir de semillas cosechadas de frutos maduros.

**HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN:**

Componente habitual de bosques de quebradas y ribereños de Cerro Largo, Tacuarembó y Rivera. También habita en las cornisas rocosas de los cerros chatos de estos dos últimos departamentos. Generalmente ocupa los estratos bajo y medio de los bosques, preferentemente en ambientes húmedos.



**crecer**  
CAPACITACION  
FORESTAL

CAPACITACION  
FORESTAL

Joaquín Suárez 3266 | Young, Rio Negro - Uruguay  
Tel + 598 567 7500 Tel/Fax + 589 567 4109 | info@crecer.com.uy  
[www.crecer.com.uy](http://www.crecer.com.uy)