

Flora autóctona: Guabirobeira

Ing. Agr. Carlos Brussa
Ing. Ag. Iván Grela

Myrtaceae (familia de los Guayabos y Eucaliptos)

Campomanesia aurea O.Berg
"Guabirobeira do campo" "Araçá rastreiro" (Bras.)

SINONIMIA

Campomanesia cyanea O.Berg

DISTRIBUCIÓN REGIONAL:

Especie del noreste de Argentina, este de Paraguay, sur de Brasil y noreste de Uruguay.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:

Hábito: arbustos de hasta 1.5 m de altura, de ramificación laxa, con tallos verdosos y/o rojizos.

Follaje: persistente de color verde glauco.

Hojas: simples, opuestas, verde glauco, con olor característico al estrujarlas, coriáceas, ovoides, de 2-3 cm de largo por 1-1.5 cm de ancho, nerviación reticulada con nervaduras bien demarcadas, las secundarias unidas en una nervadura submarginal, ápice agudo, cortamente acuminado, margen entero y base amplia, redondeada, a veces cordada, glabras. Sésiles o subsésiles.



Flores: hermafroditas, solitarias, grandes y vistosas, corola rotácea (pero de pétalos libres), con 5 pétalos obovados a

suborbiculares, blanco puro, numerosos estambres amarillentos.

Fruto: baya esférica con los

polos achatados, de color verde amarillento al madurar, de 1-2 cm de ancho, con restos de dientes del cáliz, sostenidos por pedúnculos notoriamente más largos que las hojas.

Potencialmente buena como ornamental por su follaje y floración. Frutos son comestibles.

FENOLOGÍA:

Florece a fines de la primavera y comienzos del verano. Fructifica en verano.


REPRODUCCIÓN:

Deben recogerse frutos maduros, eliminar la pulpa y lavar las semillas.

Se siembra en almácigos.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY:

Habita cerros chatos y campos arenosos de Tacuarembó, y Rivera.



Líder Mundial
en

CONSTANTINIDI
MARSH
An **MMC** Company

**Asesoramiento en Riesgos y Seguros
relacionados con el Agro**

Colonia 993 piso 10 - Montevideo - Tel: 902.11.35 - Fax: 902.12.82*