

Contribución al MEJOR CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS INDIGENAS

Por el Sr. ATILIO LOMBARDO

II Parte

Antes de seguir adelante con nuestra segunda exposición sobre "Contribución al mejor conocimiento de las plantas indígenas", consideramos muy útil la corrección de unos pocos errores tipográficos aparecidos en el número anterior, errores que habrían escapado en la composición en razón de que la terminología usada no es común. De esos pocos, la mayoría ocurrieron en los nombres científicos de las plantas allí tratadas.

Confundiendo en que no aparecerán errores en estas correcciones, ocupémonos de ello.

En la pág. 126, apareció lo siguiente: "El que lleva como nombre científico genérico *Aspidosperma*, tiene los caracteres morfológicos que damos en breve reseña; son caracteres que permiten que este árbol sea confundido con algún otro de nuestra flora"; debió decir: son caracteres que no permiten que este árbol sea confundido, etc. Al pie de la lámina 4, fue escrito *Kylosma Wargurgii* y *Kylosma ciliatifolium*; debió ser: *Xylosma Warburgii* y *Xylosma ciliatifolium*.

Continuaremos con nuestro cometido presentando primeramente tres árboles indígenas que llevan en su nombre común la palabra "molle", siguiendo con tres cuyo nombre co-

mún es "plumerillo", luego con dos conocidos bajo el nombre de "arueira", también dos con el nombre de "viraró" y finalmente dos con el de "lapachillo".

LOS "MOLLES"

En nuestra flora existen tres especies comunes que en su nombre vulgar aparece la palabra "molle", sola o acompañada de un adjetivo; aún puede este nombre encerrar todavía otra especie del mismo género y también formas de una de las tres especies de que se habla. Refiriéndonos a ellas mediante sus nombres científicos son: *Schinus molle*, *Sch. lentiscifolius* y *Sch. Polygamus* y sus formas *parviflorus*, *ovatus*, *crenatus* y otras; finalmente habría que agregar *Schinus weinmanniaefolius*, arbolillo poco conocido o confundido como una forma pequeña del *Sch. lentiscifolius*.

Aparte de lo dicho, existe una especie del género *Gymnosporia* la que algunas veces recibe el nombre común de "molle", pero creemos que es dado por personas que le confunden con el "molle rastrero" (*Sch. polygamus*). Lo mismo sucede con otra especie —esta parece corresponder al género *Bumelia* y es desconocida para la flora indígena— en el departamento de Rocha cerca de sus límites con el Brasil.

El género *Schinus* es polígamo-dioico, produciendo sus especies, por tal razón, flores masculinas en unos individuos y en otros, hermafroditas o flores femeninas con estaminodios.

Veámos nuestras especies:

SCHINUS MOLLE L — “Anacahuíta”, “Aguaribay”, “Molle”
(Lám. I, fig. 1.).

Arbol que alcanza hasta 10 metros de altura, de tronco grueso, copas o menos amplia y ramillas colgantes, estos últimos en mayor grado en los adultos.

Hojas alternas, resinosas, compuestas de numerosos pares de folíolos, éstos sésiles, lanceolados, agudos, dentados o subíntegros; pecíolo cilíndrico y raquis aplanado o poco mas o menos alado.

Flores pequeñas, amarillentas, dispuestas en panojas, éstas de mayor tamaño en los pies masculinos, pedicelos delgados: cáliz de 1 milímetro; corola de 2 mm. con pétalos obtusos; las masculinas con 10 estambres, 5 mas largos, éstos de dos milímetros; las femeninas con estaminodios muy cortos; pistilo de ovario súpero, globoso, de estilo corto y estigma trilobulado.

Fruto: drupa globosa, de 4-5 mm. de diámetro, con epicarpo rojizo y papiráceo.

Florece en el Verano.

En territorio uruguayo es ribereño y serrano. Por nuestra parte solamente lo hemos visto en el departamento de Tacuarembó; Arechavaleta, el autor de Flora Uruguaya, lo herborizó en Tacuarembó y en Cerro Largo. Vive en las tres Américas, desde México hasta nuestra República; por tal razón recibe un sin número de nombres comunes, que rara vez son dados entre nosotros: “árbol de la pimienta”, “bálsamo”, “terebinto”, “pimentero”, “curanguay”

(Argentina), “muelle”, “pimiento” (Colombia), “aroeira”, “pimenteira do Perú” (Brasil), “mulli”, “molle pimentera” (Perú), “pimiento de California” (Costa Rica), etc. etc.

Acerca de él tomamos de nuestra “Flora arbórea y arborescente del Uruguay”. *Schinus molle* L. var. *areira* (L) DC. —según Cabrera— en “Revisión de las Anacardiáceas Austroamericanas, se diferencia de la especie típica por el mayor número de folíolos (7-16 yugos), lanceolado-lineares, enteros o más o menos serrados.

“Al parecer la especie típica fue hecha con la base de elementos tomados del árbol joven y la variedad *areira* con la base de elementos del adulto.

“Cuando sembramos semillas de lo que sería la variedad *areira*, nacen plantas con caracteres de la especie típica. Lentamente va transformándose la planta y cuando envejece tiene los caracteres de dicha variedad. Esta transformación la hemos observado en ejemplares plantados en el Jardín Botánico y en el Prado”.

Según el mismo Arechavaleta, la resina que segrega este árbol es utilizada por la medicina europea y conocida allí por el nombre de Mastic americano.

SCHINUS LENTISCIFOLIUS
March. — “Molle ceniciento”, “Carobá”.

(Lám. I, fig. 2)

Generalmente se presenta como un arbusto de 3-4 metros de altura, aunque puede llegar a ser un árbol de 7-8 metros o quedar reducido a un arbustillo de 50-90 centímetros. Ramillas y follaje, cenicientos por lo común.

Hojas alternas, largas de 8-12 centímetros y compuestas de 4-7 pares




Lámina I

1. — *Schinus Molle* "Anacahuita", "Aguaribay" o "molle", ramilla en flor.
2. — *Schinus lentiscifolius* "Molle ceniciento", "Carobá", ramilla fructificada y hoja grandidentada.
3. — *Schinus polygamus* "Molle", "Molle rastrero", ramilla en flor y arriba flor masculina (aum.) debajo flor femenina (aum.).

de folíolos, éstos sésiles, opuestos o subopuestos, desde íntegros a grandidentados, estrechamente lanceolados hasta ovales y de 1,5-2,5 centímetros de largo; pecíolo de 1-2 centímetros y ligeramente alado; raquis alado.

Flores pequeñas, dispuestas en cortas panojas donde su largo medía entre 5 y 8 centímetros; cáliz pubescente y ciliado de 1 mm. o menor; corola de pétalos oblongos, de 2-2,5 milímetros de largo y cóncavos; las flores masculinas con 10 estambres de 1 mm. poco más o menos de largo; las hermafroditas con estambres más cortos, pistilo de ovario súpero, globoso y glabro, estigma trilobulado.

Fruto: drupa globosa de 4-5 milímetros de diámetro, de epicarpo papiráceo y de color rojo-lilacino, rara vez verduzco.

Florece en el Verano.

Es serrano, siendo frecuente en las sierras y cerros del departamento de Lavalleja (ex-Minas). En Montevideo se le cultiva en parques, plazas y paseos públicos.

SCHINUS POLYGAMUS (Cav.)

Cabr. "Molle", "Mölle rastrero"

(Lam. I, fig. 3)

Especie sumamente variable tanto en su porte, como en su altura y en sus hojas, así como en el número de flores en los racimillos, éstos van desde paucifloros a densifloros. Su copa generalmente es irregular y sus ramas tortuosas por lo común; las ramillas son, frecuentemente, aguzadas en su ápice el que resulta espinoso.

Hojas simples, alternas o aglomeradas en cortas yemas, lanceoladas, corta o largamente espatuladas, agudas u obtusas, angostadas hacia la base y terminando en corto pecíolo, enteras o con dientes, lampiñas, su largo casi nunca pasa de los 7 centímetros ni es menor de uno.

Flores pequeñas, blancas o blanquecinas, dispuestas en glomérulos

racimiformes que parten de la axila de las hojas, menores en largo que éstas; las masculinas con estambres (en número de 10) más largos que los pétalos; las hermafroditas con el mismo número de estambres, pero más cortos que los pétalos, pistilo de ovario súpero, estilo y estigma gruesos y no sobrepasando el largo de los pétalos.

Fruto: drupa globosa de 4-5 mm. de diámetro, con epicarpo papiráceo y de color lila.

Florece en los meses de Agosto y Setiembre.

Es serrano y ribereño, siendo común en casi toda la República.

Esta especie es frecuentemente atacada por agallas; en sus ramas y ramillas aparecen *Cecidioses eremita* Oberth., agalla de forma esférica de dos centímetros o menos de diámetro y *Dicranoses capsulifex* Kieff. et Joerg., de forma de maza, y sobre las hojas *Trioza gallifex* Kieff. et Joerg.

En Montevideo, el "molle rastreo", es escasamente cultivado en paseos, plazas y parques públicos excepto en el Jardín Botánico y en el Parque Indígena; este último posee buen número de ejemplares, aunque jóvenes.

LOS "PLUMERILLO"

Son tres los "plumerillos" que existen en la flora uruguaya y los tres pertenecen al mismo género, *Calliandra* y éste a la subfamilia Mimosoideas de la familia Leguminosas. Les es dado el nombre común de plumerillo por sus inflorescencias donde la disposición de sus flores con sus largos estambres recuerdan a un pequeño plumero. El nombre científico genérico *Calliandra* también está basado en los estambres que son notables en la mayoría de las especies (alrededor de 80); está compuesto

por las palabras griegas *callos* que significa hermoso y *andros*, hombre, usado en el sentido de sexo masculino; por otra parte, el conjunto de esos órganos masculinos de las flores reciben el nombre de androceo. El más común y más conocido de los "plumerillos" es el *Calliandra Tweediei*, llamado, muchas veces, "plumerillo rojo" en razón de que los estambres de esta especie son totalmente rojos.

Tanto éste como los otros dos viven en montes ribereños. Los tres se hallan cultivados en nuestros jardines, ya públicos o privados, aunque escasamente, no en la proporción que correspondería a plantas de su elevado valor como ornamentales.

CALLIANDRA TWEEDIEI Benth.
"Plumerillo", "Plumerillo rojo".

(Lám. II, fig. 1)

Arbusto de dos o tres metros o muy poco más de altura, generalmente muy ramificado desde su base; de follaje persistente; ramillas jóvenes con pelos más o menos largos.

Hojas alternas, dos veces compuestas (bipinnadas), 3-4 yugadas, folíolos lineales, con pelos en la cara superior.

Flores vistosas por su estambres largos y de color rojo, dispuestas en cimas capituliformes sobre un pedúnculo común de 4-5 centímetros de largo, axilares; cáliz de 3 mm. de largo, de color castaño y con algunos pelos; corola de color más claro y dos o tres veces más larga, con pétalos vellosos en el ápice; estambres numerosos, de 3-4 centímetros de largo y de color rojo brillante; pistilo con estilo del mismo color que los estambres y un poco más largo.

Legumbre subleñosa, de 4-8 cms. de largo, cubierta de pelos rojizos. Florece en la Primavera, pero durante el Otoño pueden aparecer algunas inflorescencias.

En estado silvestre le hemos visto en el departamento de Artigas a orillas de los ríos Uruguay y Cuareim y en Salto a orillas del Arapey y del Daymán.

En Montevideo, bajo cultivo, fructifica muy poco aunque florece abundantemente.

CALLIANDRA PARVIFLORA
(Hook. & Arn.) Spég. "Plumerillo"

Arbusto con cierta semejanza a la especie anterior, pero de follaje más ralo; las ramillas jóvenes generalmente son glabras (sin pelos).

Hojas bipinnadas, 3-6 yugadas; folíolos lineales, más angostos que en *C. Tweediei* y sin pelos.

Inflorescencia axilar, sostenida por un pedúnculo de 4-5 cms.; cáliz de 2 milímetros de largo; corola doble o triple en largo; estambres numerosos, de 3-4 centímetros de largo, blancos en su mitad inferior y róseos en la superior; pistilo con estilo semejante a los estambres.

Legumbre subleñosa, de 4-6 centímetros de largo.

Vive a orillas de los ríos Uruguay y Negro, hallándose también en ríos y arroyos del noreste de la República.

En el cultivo se desarrolla —muchas veces— en forma de arbusto aplanado extendiendo su copa hasta 8-9 metros de diámetro y no pasando de dos metros en altura.

Florece abundantemente.

Le favorece el abrigo de otras plantas que le sobrepasen en altura. En el Jardín Botánico existe un notable ejemplar desarrollado en extensión que abarca más de 40 metros cuadrados.

En su nomenclatura botánica tiene varios sinónimos, el más conocido entre nosotros es *Calliandra bicolor* Benth.

CALLIANDRA SELLOI (Spreng.)

Macbr. — "Plumerillo".

(Lám. II, fig. 3)

En su aspecto general se asemeja más a *C. Tweediei* que a la especie

anterior aunque en altura difícilmente llegue a los tres metros.

Hojas bipinnadas pero con un solo yugo de pinnas, folíolos también lineales.



Lámina II

1. — *Calliandra Tweediei* "Plumerillo rojo", ramilla en flor.

2. — *Calliandra parvifolia* "Plumerillo"; ramilla con una inflorescencia y tres legumbres.

3. — *Calliandra Selloi* "Plumerillo"; ramilla en flor.

Inflorescencia algo menor que las de las especies anteriores; flores muy semejantes a la segunda; estambres de color blanco en su mitad inferior y óseos o casi rojos en la superior.

Legumbre algo semejante a la de *C. Tweediei*, pero glabra.

También vive a orillas de los ríos Uruguay y Negro, aunque puede ser hallada en el norte y noreste de la República.

Florece en la Primavera y también a principios del Otoño.

Bajo cultivo —como ornamental— es tan decorativa como el “plumerillo rojo”.

También esta especie tiene sinónimos en su nomenclatura científica; el más difundido es *Calliandra brevipes* Benth.

LAS “ARUERAS”

En nuestro país viven dos “arueras”, por momentos confundibles entre sí, pero pueden ser fácilmente diferenciadas con simples observaciones. Ambas pertenecen al mismo género, *Lithraea*. Mientras que *L. brasiliensis*, la “aruera” común en algunos cerros y sierras, se eleva como un arbusto de 2 ó 3 metros de altura y posee hojas simples generalmente, *L. molleoides* es de mayor tamaño llegando, muchas veces, a ser un árbol que puede medir unos 7 metros de altura y aún sobrepasarlos, poseyendo hojas compuestas de 3 ó 5 folíolos y habitando comunmente zonas ribereñas.

Estas dos clases de “arueras” —aunque se las tome por una sola— son muy conocidas por el hombre del campo en razón de la acción alergógena que ejercen sobre la piel, no cubierta por la ropa, de las personas sensibles a ese efecto, provocándoles una dermatitis muchas veces molesta en sumo grado.

En nuestra campaña se le teme a la acción de la “aruera” y creen librarse de su daño con el tan conocido saludo al revés, que consiste en: “Buenos días Señora Aruera” por la tarde y “Buenas tardes Señora Aruera” si es de mañana. Hay otras creencias para librarse del daño, pero ellas son menos difundidas.

La dermatitis que provocan estas plantas, así como otras Anacardiáceas y aún plantas que no pertenecen a esta familia, es debido a sustancias volátiles, conocidas por la ciencia médica, que se desprenden de toda la planta.

Se ha observado que con el calor aumentan los desprendimientos de esas sustancias en nuestras arueras. Las personas que continuamente tienen contacto con plantas que provocan dermatitis se sensibilizan y son atacadas fácilmente.

La acción alergógena provocada por las “arueras”, por el “litre” chileno, otras Anacardiáceas, algunas Euforbiáceas, el género *Prímula*, etc., en el hombre, está extensamente tratada por el Dr. Pablo Recarte y el Prof. Raúl Vaz Ferreira en el capítulo titulado *Dermatitis Filogénica*, del libro “*Alergia en la práctica clínica*” de los doctores B. Varela Fuentes, P. Recarte y A. Graña, publicado en Montevideo en el año 1945.

Pasando a nuestro cometido, daremos aquí las diferencias de estas dos “arueras”. El género a que pertenecen, *Lithraea*, es polígamo como sucede con *Schinus*; ambos pertenecen a la familia de las Anacardiáceas.

LITHRAEA MOLLEOIDES (Vell.) Engl. “Aruera” (Lám. III. fig. 1.)

Arbol de poca altura, aunque puede desarrollar amplia copa; de foliaje persistente.

Hojas alternas, compuestas por 3-5 folíolos sésiles, largos de 3-4 centímetros por 1-2 de ancho, íntegros; raquis y aún pecíolo alados (los individuos jóvenes producen hojas simples.)

Flores amarillentas o verduzcas, pequeñas, dispuestas en una inflorescencia racimosa o apanojada; cáliz 5-dentado; corola con 5 pétalos;

las masculinas con 10 estambres; las femeninas (o mejor, las hemafroditas) con 10 estambres de pequeño tamaño (pueden ser considerados estaminodios); pistilo de ovario súpero, tricarpelar y unilocular, estilos tres.

Fruto: pequeña drupa globosa o ligeramente aplanada, con epicarpo papiráceo.



Lámina III

1. — *Lithraea molleoides* "aruera", ramilla masculina florecida y ramilla femenina con flores y una hoja.
2. — *Lithraea brasiliensis* "aruera", ramilla fructificada.

Florece a fines de la Primavera o en el verano.

Vive con preferencia a orillas de ríos y arroyos, pero se le puede encontrar integrando la flora de cerros y sierras.

Se le cultiva en paseos montevideanos, aunque existen en ellos escaso número de ejemplares. El árbol cultivado provoca el mismo daño que en el estado silvestre.

En el noreste de la República Argentina fabrican con sus frutos una bebida alcohólica fermentada (aloja). También en la Argentina sus frutos y aún sus hojas son considerados medicinales; usan sus infusiones, o los agregan al mate, como estomacal y diurético. De ahí le llega su nombre común argentino de "molle de beber".

En cuanto a su nombre científico, es posible que haya quienes estén interesados en saber el significado de las abreviaturas que aparecen en el binomio perteneciente a esta especie, *Lithraea molleoides* (Vell.) Engl. Vell., corresponde al nombre del fraile Vellozo, botánico brasileño, quien fue el primero en describir esta especie de "aruera" y publicarla bajo el nombre de *Schinus molleoides*. Como *Schinus* es un género que no encierra a esta "aruera", el botánico alemán Engler la pasó al género *Lithraea* que la comprende, conservando el nombre específico *Molleoides* que pertenece, por prioridad, a Vellozo.

LITHRAEA BRASILIENSIS L.
March. "Aruera" (Lám. III, fig. 2.)

Esta especie, que también es conocida bajo el nombre común de "aruera", es un arbusto que se eleva a dos o tres metros de altura; muy rara vez pasa esta medida. Follaje persistente.

Hojas simples, alternas, enteras, a veces trifoliadas, apiculadas.

Flores y frutos semejantes a la especie anterior.

Por lo común vive en cerros y sierras. En los departamentos de Maldonado y Lavalleja es fácil hallar grandes cantidades de individuos de esta especie.

Bajo cultivo se halla en el Jardín Botánico.

LOS "VIRAROS"

Podemos decir que entre los árboles indígenas existen dos especies bien conocidas que reciben el nombre común de "viraró". Ambas pertenecen al género *Rupretchia*; fuera de ellas, es posible que haya que agregar un tercer "viraró", o mejor dicho, una tercera especie de tal género en nuestra flora, el *Rupretchia laxiflora*, la que creímos reconocer en individuos observados rápidamente a orillas del río Uruguay en el Departamento de Paysandú.

Pero nos ocuparemos de los dos "viraroes" bien conocidos. De estos dos, hay una al que se le estima mas en razon de su madera muy apreciada para trabajos de mueblería, es la que describimos primeramente.

El género *Rupretchia* es dioico, es decir, que poseen sus especies individuos masculinos e individuos femeninos.

RUPRETCHIA POLYSTACHYA
Gris. "Viraró", "Viraró crespó"
(Lám. IV, fig. 2)

Arbol que puede elevarse a buena altura y su tronco adquirir un diámetro hasta de 80 centímetros (en individuos excepcionales ese diámetro puede ser mayor).

Hojas simples, alternas, ovoides u ovoides con ápice alargado, enteras, muchas veces onduladas en el bor-

de lo que le vale su nombre común de "viraró crespo"; ocrea rápidamente caduca como en casi todas las especies del género.

Flores apétalas, pequeñas, dispuestas en panojas de poco tamaño; las masculinas con cáliz 6-partido, segmentos obtusos y ciliados, estam-



Lámina IV

1. — *Rupretchia salicifolia* "Viraró"; ramillas masculina y femenina; arriba, flores masculinas y femeninas (aumentadas).
2. — *Rupretchia polystachya* "Viraró", "Viraró crespo"; íd. íd., íd. íd.

bres 9, mas largos que los segmentos del cáliz; las femeninas con cáliz 3-partido, lobos muy largos, sobrepasando al pistilo, obtusos y papiráceos; pistilo con tres estilos apenas libres.

Fruto seco, uniseminado.

Es ribereño preferentemente; nosotros le hemos visto en Paysandú a orillas del río Uruguay, en Tacuarembó y en varios ríos y arroyos en el norte del departamento de Florida.

No existe bajo cultivo en paseos montevidéanos.

RUPRETCHIA SALICIFOLIA C. A. Mey. "Viraró", a veces "Ibirá-ró" (Lám. IV, fig. 1.)

Arbol de poca altura y de tronco tortuoso generalmente, de corteza oscura, ramas abiertas e irregulares, ramillas flexibles y poco mas o menos colgantes; de follaje caduco finalmente.

Hojas lanceoladas, a veces largamente elípticas y aún oblanceoladas, por lo común agudas, larga de 8 hasta 18 centímetros, con pecíolo muy corto y ocrea rápidamente caduca.

Flores apétalas, pequeñas y dispuestas en panojas de poco tamaño, terminales o axilares; las masculinas con cáliz de 6 divisiones y 9 estambres; las femeninas soportadas por pedicelos mas largos que el cáliz y filiformes, cáliz con tres divisiones, pistilo con tres estilos apenas mas cortos que las divisiones del cáliz.

Fruto seco, uniseminado, romboideo-fusiforme, acanalado, de color castaño, incluído en el cáliz y de 9-11 milímetros de largo.

Florece en los meses de Noviembre y Diciembre.

Vive a orillas de ríos y arroyos en la proximidad del agua; le hemos visto sobre el río Uruguay en los de-

partamentos de Artigas, Salto y Paysandú.

En Montevideo se le cultiva en el Jardín Botánico y en el Parque Indígena; raramente se le halla en paseos, plazas y parques públicos.

LOS "LAPACHILLOS"

Estos corresponden a dos géneros distintos, aunque pertenecen a una misma familia, Leguminosas.

LONCHOCARPUS NITIDUS Benth. "Lapachillo" (Lám. V, fig. 1.)

Arbol de mediana altura, vive a orillas de los ríos Uruguay y Negro y en otros ríos y arroyos del norte de la República; su follaje es caduco finalmente.

Hojas glabras (lampiñas), compuestas de 7-9 folíolos, éstos de 1-1½ centímetros de ancho por tres veces el largo o largamente ovoides dentro de esas medidas, de borde entero.

Inflorescencia dispuesta en racimo que mide 10 centímetros o muy poco más de largo. Flores amariposadas (papilionadas) de 1 cm. o poco mas de largo, de color roseo-violáceo; cáliz con bracteola de un milímetro; corola de estandarte (pétalo mayor) orbicular y apenas escotado, alas (pétalos laterales) algo falcadas, quilla (pétalos inferiores soldados entre sí o casi soldados) de pétalos semejantes a los de las alas; estambres 10, 9 soldados en un tubo y el décimo casi libre, adherido en parte al tubo; pistilo de ovario lineal y estilo filiforme.

Legumbre lisa, con 1-5 semillas arriñonadas.

Arechavaleta, en Flora Uruguayana Vol. III, t. I, pág. 400, lo describe bajo el nombre (erróneo, sin dudas) de *Lonchocarpus neuroscapha Benth.*, pero convencido de que no concor-

daba la descripción de Benthám en Flora Brasiliensis con el árbol de nuestra flora, hace esta observación final: "Con buenos ejemplares en flor y fruto a la vista describimos esta especie modificando en parte a Benthám 1. c., de tal modo que

"nuestra descripción correspondería a la variedad *Martiana* de dicho autor, o más bien, convendría crear otra con el nombre de *L. uruguaya*".

En cuanto a las últimas palabras es posible que Arechavaleta pensó decir "o mas bien convendría crear




Lámina V

1. — *Lonchocarpus nitidus* "Lapachillo", ramilla en flor; legumbre.
2. — *Poecilanthus parviflora* "Lapachillo", ramilla en flor y separadamente dos legumbres.