

BOLETIN del



MUSEO NACIONAL de HISTORIA NATURAL

MONTEVIDEO - URUGUAY

Julio de 1977

Número 17

VEGETACION DE LAS ISLAS DEL RIO URUGUAY MEDIO

De los distintos tipos de vegetación de nuestro país, hay uno que se destaca por características más llamativas y que constituye una agrupación botánica de aspectos únicos en el Uruguay.

Se trata de los montes ribereños y de las islas del río Uruguay Medio, comprendidos entre las desembocaduras de los arroyos Mandiyú y Guabiyú, en la 8a. Sección Judicial del departamento de Artigas. Las coordenadas geográficas correspondientes son: casi sobre el paralelo 57° 54' 15" W en toda su extensión desde los 30° 29' 30" S a los 30° 40' S., o sea una franja del río Uruguay de aproximadamente 22 kilómetros. Las islas ubicadas en esa área son: Zapallo, Rica, Carbonera, Misionera y Guabiyú.

La mayor de estas islas es la Zapallo, que tiene una extensión máxima de 5.500 m y un ancho de 750 m; muy próxima está la isla Rica de 3.500 m de longitud y 650 m de ancho. Ambas islas, orientadas de SW a NE, forman un grupo que tiene una separación por un canal; esporádicamente puede presentar un banco de arena que casi las une.

Otro grupo es el formado por las islas Carbonera de 750 m de largo por 200 de ancho, y por la isla Misionera que tiene 1.400 m de longitud por 200 de ancho; ambas islas tienen una orientación de S a N.

Separada de este grupo por aproximadamente 11 kilómetros está la isla más pequeña de todas, la Guabiyú, de forma casi cuadrada y con 250 metros de lado



Los montes hidrófilos o marginales de nuestros ríos y arroyos tienen una composición botánica característica a casi todas estas agrupaciones de nuestro territorio.

La importancia botánica que tienen los montes de estas islas del río Uruguay, consiste en que están formados por un gran número de especies higromegatermas de origen subtropical, provenientes de latitudes más septentrionales como Misiones y el Alto Uruguay.

Este tipo de vegetación está representado únicamente en nuestro país por los montes de estas islas, desde Bella Unión hasta las proximidades de Salto. Pero indudablemente las islas citadas más arriba son las que poseen el monte más representativo por el número y la calidad de sus especies subtropicales, además de que en su aspecto no se nota, como en otras islas, el efecto nocivo de la tala y la persecución de varias especies de buena calidad de madera, incluso para ebanistería.

Conjuntamente con este tipo tan particular de vegetación se halla una muy rica avifauna, formada por especies que únicamente viven en esa región.

La vegetación de esta zona se puede clasificar como "Pluviisilvae", o más claramente como "Selva Subtropical Marginal" o "de Galería".


La presencia de numerosas especies subtropicales propias de las selvas misioneras, el alto porte de los árboles, la densidad de la vegetación, el aspecto cerrado de la galería, la carencia casi absoluta de especies herbáceas y de menor tamaño por la ausencia de sol en el estrato inferior, y la gran cantidad de epífitas y trepadoras, hacen un tipo de vegetación desconocido en el resto de nuestro país.

La bóveda del monte tiene unos 10 a 12 metros de altura, de la cual sobresalen ejemplares de 25 metros con troncos de gran diámetro.

El monte de las islas presenta un aspecto exterior cerrado, a causa de una amplia barrera de especies más afines al agua, tales como: "sarandí", "blanquillo", "ingá", "sangre de Drago" y "sauce".

El núcleo fundamental del monte y los árboles que forman su bóveda son especies de buena talla como: "pitanga amarga", "guabiyú", "cambuata", "caá-obetí", "chal-chal", Maba inconstans, "cambuy", "zapirindí", "guazatumbá", "garugandrá", "viraró", etc.

Como especies mayores, que sobresalen de la bóveda del monte se



encuentran: la caña "tacuaruzú" (Guadua angustifolia), gigantesca bambúsea que tiene hasta 20 metros de altura y cañas de 25 centímetros de diámetro en su base; el inmenso "ibirapitá" o "canafistula" (Peltophorum dubium), del cual existen ejemplares de más de 25 metros de altura, con troncos de 8 y más metros de circunferencia y con copas en forma de sombrilla con una extensión de 40 metros cuadrados. Otras especies de gran tamaño son: "timbó" (Pithecellobium multiflorum), "lapacho" (Tebeuia ipe), "aguay" (Pouteria gardneriana), "guayubira" (Patagonula americana), "angico" (Piptadenia rigida), "añil" (Indigofera suffruticosa), "lapachillos" (Poecilanthus parviflorus y Lonchocarpus nitida), "higuerón" (Ficus monckii), "laurel" (Nectandra membranacea), etc.

Es de destacar que el conocimiento de las especies botánicas de estas islas es aun incompleto, habiéndose registrado varias especies arbóreas nuevas para el Uruguay en sucesivas recorridas.

El embalse de la represa de Salto Grande provocará la desaparición de gran parte de estos montes; quedarán pues ignoradas para la ciencia y para el conocimiento popular especies únicas tanto vegetales como animales que viven unicamente en esta región.

Es de fundamental urgencia hacer un relevamiento sistemático con estricto carácter científico para rescatar muestras de especies que de lo contrario están destinadas a desaparecer.

Debe servirnos de ejemplo el caso de estos magníficos montes y tratar con una política inteligente de perpetuar otras áreas representativas de nuestra vegetación indígena, impidiendo que desaparezcan por el efecto del hacha o por un abuso total de sus recursos.

Quedan aún en el Uruguay lugares con montes representativos de los distintos tipos de vegetación que, es deber de todos, tratar de salvar antes de que desaparezcan o se modifiquen rápidamente.

Ricardo Praderi

X-X-X-X-X-X

IMPORTANTE ADQUISICION

El Museo ha adquirido un ejemplar, probablemente único en el país, de "kiwi", Apteryx australis, ave áptera de Nueva Zelandia. El espécimen naturalizado se encontraba en el Uruguay desde hace varias decenas de años, habiendo pasado ahora a ser propiedad del Musel, donde en breve será exhibido al público.