

Flora autóctona: *Ruprechtia laxiflora*



Polygonaceae (familia del Viraró)
Ruprechtia laxiflora Meisn. "Viraró crespó"
 "Marmelero" "Marmeleiro" (Bras.)

DISTRIBUCIÓN REGIONAL:

Norte de Argentina, Brasil (desde Bahía hasta Río Grande do Sul), Paraguay y Uruguay.

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS:

Hábito: árboles de hasta 15 m de altura, fuste recto cuando crece en el interior del bosque, corto y ramificado, más achaparrado cuando crece aislado. Corteza gris oscuro, asurcada longitudinalmente, exfoliándose en pequeñas placas cuando son árboles de muchos años.

Follaje: generalmente caduco o semipersistente, de color verde brillante.

Hojas simples, alternas, levemente discoloras, verde amarillento y brillantes en el haz, subcoriáceas,

láminas lanceoladas, elípticas u ovadas, de 1.5-3 cm de ancho x 5-7 cm de largo, glabras, de ápice agudo, margen liso, base desde cuneada hasta obtusa o redondeada, subsésiles o con pecíolos muy cortos. Péndulas y generalmente algo plegadas sobre el nervio central.

Inflorescencias: unisexuales (especie dioica) en racimos axilares o terminales a veces muy agrupados de 1-3 cm de largo.

Flores: actinomorfas, apétalas, de color amarillento, las masculinas con 6 sépalos y 6 estambres; las femeninas con 3 sépalos persistentes aún luego de la madurez del fruto. En frutos inmaduros el cáliz adquiere una destacable coloración rosada.

Fruto: seco, indehiscente, trígono, de 0.5-0.8 cm de largo, de color marrón claro brillante, rodeado por el cáliz de color castaño claro, cuyos sépalos, a diferencia de otra especie muy similar (*R. salicifolia*), poseen las bases bien separadas de manera que



dejan expuesto el fruto. Persistentes por algún tiempo en el árbol, luego caedizos.

Muy interesante como ornamental por su porte, follaje brillante y la coloración de los frutos durante la maduración.

HÁBITAT Y DISTRIBUCIÓN EN URUGUAY:

Bosques ribereños y de quebradas de casi todo el país exceptuando el centro y sur.

FENOLOGÍA:

Follaje semipersistente. Florece a partir de la primavera y fructifica en verano.

REPRODUCCIÓN:

Se reproduce fácilmente por semillas. Los frutos se deben sembrar en almácigos a media sombra.



crecer
CAPACITACION
FORESTAL

**CAPACITACION
FORESTAL**

Joaquín Suárez 3266 | Young, Rio Negro - Uruguay
Tel + 598 567 7500 Tel/Fax + 589 567 4109 | info@crecer.com.uy
www.crecer.com.uy